羟自由基对三聚铝酸根离子($\text{Al}_3\text{-B}$ 基团) 环合反应的影响

尹周澜, 丁治英, 李俊, 张牧群

(中南大学 化学化工学院, 长沙 410083)

摘要: 为探究超声场作用强化过饱和铝酸钠溶液分解的机理, 采用量子化学密度泛函计算方法, 分析 $\text{Al}_3\text{-B}$ 基团的几何性质和羟自由基进攻的活性部位; 同时设计了羟自由基参与 $\text{Al}_3\text{-B}$ 基团环合反应的可能路径; 通过反应势能面扫描分析, 优化得到反应路径上的过渡态和中间体的几何构型, 利用振动频率分析对过渡态和中间体进行了确认。结果表明: 羟自由基有两条可能的反应路径参与 $\text{Al}_3\text{-B}$ 基团的环合反应, 其活化能均为 109 kJ/mol, 比无自由基参与时的降低约 70 kJ/mol。

关键词: $\text{Al}_3\text{-B}$ 基团; 羟自由基; 环合反应; 密度泛函理论

中图分类号: TF01; O644.3

文献标志码: A

Effect of $\cdot\text{OH}$ radical on cyclization reaction of trimer aluminate ions ($\text{Al}_3\text{-B}$ cluster)

YIN Zhou-lan, DING Zhi-ying, LI Jun, ZHANG Mu-qun

(School of Chemistry and Chemical Engineering, Central South University, Changsha 410083, China)

Abstract: To investigate the decomposition mechanism of supersaturated sodium aluminate solution with ultrasound, an advanced quantum chemical calculation technique with density functional theory (DFT) was used. The model geometry of $\text{Al}_3\text{-B}$ cluster and the relevant part of reactivity were determined. The possible paths of cyclization reaction for $\text{Al}_3\text{-B}$ cluster with $\cdot\text{OH}$ radical were also designed. Meanwhile, the geometries of transition states and intermediates were optimized and verified by PES and frequency calculation. The results show that the $\cdot\text{OH}$ radical is beneficial to the appearance of circled growth unit $[\text{Al}_6(\text{OH})_{22}(\text{H}_2\text{O})_2]^{4-}$. There are two possible paths of polymerization of $\text{Al}_3\text{-B}$ cluster with $\cdot\text{OH}$ radical. The activity energy is 109 kJ/mol, which is decreased by about 70 kJ/mol.

Key words: $\text{Al}_3\text{-B}$ cluster; $\cdot\text{OH}$ radical; cyclization reaction; density functional theory

铝酸钠溶液的分解是氧化铝生产的重要环节, 由于溶液分解速度缓慢, 分解率较低, 铝酸钠溶液的分解成为氧化铝生产的瓶颈^[1-2]。深入研究铝酸钠溶液的分解机理, 对调控铝酸钠溶液的分解过程, 保证分解产品质量具有重要意义。李小斌等^[3]经过大量的研究认为, 铝酸钠溶液分解过程中有利于氢氧化铝析出的含铝离子是 $\text{Al}(\text{OH})_4^-$, 调控溶液中其他复杂含铝离子

结构向该类结构转变则有利于氢氧化铝析出; 李洁等^[4-5]将量子化学计算与实验相结合研究了铝酸钠溶液分解的微观机理, 提出有利生长基元的形成是溶液分解的关键, 其中, 四配位 $\text{Al}(\text{OH})_4^-$ 离子通过质子转移形成六配位的生长基元 $[\text{Al}(\text{OH})_4(\text{OH}_2)_2]^-$, 以及三聚铝酸根离子 ($\text{Al}_3\text{-B}$ 基团) 间环合反应形成六元环 $[\text{Al}_6(\text{OH})_{22}(\text{H}_2\text{O})_2]^{4-}$ 是铝酸钠溶液, 其中三聚铝酸根离

子间环合反应的活化能高达 158.0 kJ/mol, 其转化过程如下:

该六元环铝酸根离子很容易转变为有利生长基元 $[Al_6(OH)_{18}(H_2O)_6]$, 从而不断叠合形成氢氧化铝晶体。

因此, 铝酸钠溶液强化分解的关键就是找到促进生长基元形成的方法。ZHANG 等^[6]、WU 等^[7]和孙文乐等^[8]研究发现经超声波处理后的种分精液有利于提高溶液分解率、缩短分解时间。关于超声场强化溶液分解的原因, 多数学者认为是由于超声波在液体中产生空化效应, 当超声功率达到空化阈值时, 溶剂媒质中的空泡发生瞬间崩溃, 在其周围产生局部高温高压, 这一极端的物理化学环境可以致使某些化学键迅速断裂, 导致自由基的形成^[9-10]。张牧群等^[11]应用电子顺磁共振(EPR)以及自由基捕获技术, 检测到铝酸钠溶液在超声波空化作用下产生羟自由基($\cdot OH$)。尹周澜等^[12]采用半经验量子化学计算方法 AM1 分析了超声场作用下产生的羟自由基可促进铝酸钠溶液中 Al(III)配位数的增加, 形成长基元单体 $[Al(OH)_4(OH_2)]^-$, 即促进铝酸钠溶液分解的第一个控制步骤的反应。

为了探究超声场产生的羟自由基($\cdot OH$)是否能强化三聚铝酸根离子(Al_3-B 基团)间的环合反应, 以促进有利生长基元 $[Al_6(OH)_{18}(H_2O)_6]$ 的形成, 本文作者采用量子化学计算方法分析羟自由基($\cdot OH$)参与三聚铝酸根离子间环合反应的活化能、反应途径、过渡态等, 为超声场强化铝酸钠溶液的分解过程提供理论支撑。

1 计算方法

在 DFT/BLYP/DND 水平下, 对 Al_3-B 基团环合反应进行反应势能面(PES)扫描研究, 分析反应路径上各驻点的几何构型, 并利用振动频率分析确认反应的过渡态(TS)和中间体(IM)。然后通过判断能量的变化, 正确关联反应物、中间体、过渡态以及生成物。为了得到更可靠的相对能量值, 在 BLYP/DND 优化的基础上进一步选用精度较高的 DNP 进行模型体系的单点能计算, 利用零点振动能(ZPVE)校正获得反应的活化能。所有的工作均在中南大学化学化工学院 Sigworkstation 量子化学工作站 Cerius² 4.6 的 Dmol³ 计算模块中完成。

2 结果与讨论

2.1 Al_3-B 基团及其生成物六元环 $[Al_6(OH)_{22}(H_2O)_2]^{4-}$ 的几何构型

根据李洁^[4]对过饱和铝酸钠溶液自发成核的研究, 四配位 $Al(OH)_4^-$ 离子通过两次质子转移聚合形成三聚体铝酸根离子(Al_3-B 基团), 该三聚体中所有铝的配位数均为 6。通过三聚体间的缩合, 最终形成有利生长基元 $[Al_6(OH)_{22}(H_2O)_6]$ 。为了研究羟自由基对该环合反应的影响, 首先对反应物 Al_3-B 基团和生成物六元环 $[Al_6(OH)_{22}(H_2O)_2]^{4-}$ 进行几何优化, 在 Cerius² 程序中选用 OFF 的 Universal1.02 力场对模型体系进行初步优化, 再采用 DFT/BLYP/DND 方法进行条件优化, 最后改用精度更高的 DNP 基组求其单点能, 并采用 FORCE 分析得到模型的振动频率和零点振动能(ZPVE)。 Al_3-B 基团的优化几何构型和相关几何参数分别见图 1 和表 1, $[Al_6(OH)_{22}(H_2O)_2]^{4-}$ 的优化几何构型见图 3(f)所示。

图 1 Al_3-B 基团的优化几何构型示意图

Fig. 1 Schematic diagram showing optimized geometric structures of Al_3-B cluster

优化后的 Al_3-B 基团属于 C_1 点群, $Al1$ 和 $Al3$ 上的一OH、 $-OH_2$ 以及 $-OH-$ 基团的几何结构性质十分相似。分析表 1 中的部分结构参数可知, Al_3-B 基团的 $Al1-OH$ 中 $Al-O$ 的键长大致为 1.8Å 左右, 小于端基 $Al-O(H_2)$ 的键长, 另外该键与相邻 $Al-O$ 键之间的夹角明显小于端基 $Al-O(H_2)$ 与相邻键的夹角。类似地, $Al2$ 上的 $Al-OH$ 也有同样的情况。根据配位化学中配位键之间的相互作用等相关原理^[13], 可以说明 $Al2$ 上的 $Al-OH$ 所受的排斥力比端基的相同键要小, 因而该位置上的键能相对较大。比较端基

表 1 $\text{Al}_3\text{-B}$ 基团的部分几何结构参数Table 1 Partial optimized geometric parameters of $\text{Al}_3\text{-B}$ cluster

Al—O bond	Bond length/Å	O—H bond	Bond length/Å	O—Al—O bond	Bond angle/(°)
Al 1—O 5	1.8291	O 5—H 19	0.921 3	O 5—Al 1—O 8	93.430
Al 1—O 7	2.0544	O 7—H 21	0.966 8	O 5—Al 1—O 7	112.728
Al 1—O 8	1.8802	O 10—H 22	0.942 1	O 8—Al 2—O 10	114.785
Al 2—O 8	1.9455	O 11—H 23	0.954 2	O 8—Al 2—O 11	147.871
Al 2—O 10	1.7921				
Al 2—O 11	1.9048				

铝上的 Al—OH_2 和 Al—OH , 可以看出键 $\text{Al—O}(\text{H}_2)$ 的键长要比键 $\text{Al—O}(\text{H})$ 的键长大约 0.2Å , 可能前者的键能要比后者弱。此外, 对比体系中的 O—H 键的键长发现端基铝上配位水分子中的 O—H 键的键长最大, 为 0.96Å 左右。所以通过几何参数分析可以初步得出, 端基上配位的水分子中 O—H 键容易断开。根据计算所得的模型结构参数对比文献, 李洁^[4]对铝酸钠溶液作 X 射线衍射分析时得出, 溶液中 $\text{Al—O}(\text{H})$ 的键长约为 1.82Å 。KUBICKI 等^[14]在对聚合铝酸根离子进行理论计算求得的结构参数分别为 $\text{Al—O}(\text{H})$ 的键长平均值为 1.83Å ; $\text{Al—O}(\text{H}_2)$ 的键长平均值为 1.99Å 。本实验中计算的 $\text{Al—O}(\text{H})$ 的键长平均值为 1.81Å , $\text{AlO}(\text{H}_2)$ 的键长平均值为 1.98Å , 与这些文献值符合得很好, 说明该计算方法及所选模型结构合理可靠。

自由基具有的特性(如顺磁性等)与自由基中存在的未成对电子有关。根据 STEMMLER^[15]和 CABRAL 等^[16]对自由基反应的研究表明, 在气相或液相中发生的自由基反应十分相似, 即溶剂化作用造成的影响不大。因此, 本文作者在理论模拟计算时忽略了离子的溶剂化效应。通过分析羟自由基和 $\text{Al}_3\text{-B}$ 基团的前线轨道能量、电荷分布以及自旋密度, 确定 $\text{Al}_3\text{-B}$ 基团与自由基发生反应的活性中心位置, 以探讨两个基团的相互作用。

2.2 模型体系反应活性中心的分析

不同方法计算模型体系 $\text{Al}_3\text{-B}$ 基团所得到的总能量、前线轨道能量及能级差列于表 2。在 BLYP/DNP 水平下计算所得总能量要略低于 UHF/6-31G 水平下计算值, 但两者相差不大。分析 $\text{Al}_3\text{-B}$ 基团的前线轨道能级及能级差可知, LUMO(最低空分子轨道)具有较高的能量, 不易获得电子; 而 HOMO(最高占据分子轨道)具有相对低的能量, 不易给出电子。HOMO 与 LUMO 之间的能级差较大, 不易发生电子跃迁。另外, 从图 2 中 $\text{Al}_3\text{-B}$ 基团的前线轨道电子云分布情况来看, HOMO 的电子云主要集中在两个端基的—O 位

表 2 $\text{Al}_3\text{-B}$ 基团和羟自由基的总能量、前线轨道能量及能级差Table 2 Total energy, frontier molecular orbital energy and energy gaps of $\text{Al}_3\text{-B}$ cluster and $\cdot\text{OH}$ radical under DFT/BLYP/DNP level

Specie	$E_{\text{total}}/\text{a.u.}$	$E_{\text{LUMO}}/\text{a.u.}$	$E_{\text{HOMO}}/\text{a.u.}$	$\Delta E/\text{a.u.}$
$\text{Al}_3\text{-B}$ cluster	-1783.8776	0.2475	-0.1963	0.4438
$\cdot\text{OH}$ radical	-75.7201	0.0336	-0.0112	0.0448

图 2 $\text{Al}_3\text{-B}$ 基团和 $\cdot\text{OH}$ 自由基的前线轨道Fig. 2 Frontier molecular orbitals of $\text{Al}_3\text{-B}$ cluster and $\cdot\text{OH}$ radical

置, 这表明羟自由基易与该吸引电子的活性部位结合。LUMO 的电子云主要分布于铝原子和氢原子上, 且具有较强的排斥电子能力, 故当自由基与端基上— OH_2 结合后, 自由电子很难发生转移。

表 3 所列为模型体系 $\text{Al}_3\text{-B}$ 基团在 DFT/BLYP/DNP 水平下计算的部分原子净电荷分布情况。由表 3 可见, 模型体系的正电荷分布于 Al 原子和 H 原子上。其中 Al1、Al2 和 Al3 原子的正电荷分别为 1.7355、1.8811 和 1.7322, 原子具有相对强的吸电子能力。但从基团的几何结构分析, Al 原子分布在离子内层, 外面包裹着 O 原子。因此, 暴露在离子基团外面的氢原子成为自由基进攻的对象。其中端基— OH_2 中的氢原子因带正电荷较高, 其自旋密度大于 0, 且相对较大, 成为羟自由基与离子结合的活性部位。

2.3 羟自由基参与 $\text{Al}_3\text{-B}$ 基团环合反应的中间体和过渡态

羟自由基参与 $\text{Al}_3\text{-B}$ 基团的环合反应生成六元环

表3 Al₃-B基团的电荷分布Table 3 Total atomic net-charge for Al₃-B cluster

Atom	Charge	Atom	Charge	Atom	Charge
Al1	1.7355	O13	-1.0300	H25	0.4757
Al2	1.8811	O14	-1.0292	H26	0.3908
Al3	1.7322	O15	-0.8747	H27	0.3776
O4	-1.0858	O16	-1.0811	H28	0.4142
O5	-1.0400	O17	-1.0651	H29	0.4159
O6	-1.0323	H18	0.3941	H30	0.4058
O7	-0.9006	H19	0.3860	H31	0.4112
O8	-1.0832	H20	0.3903	H32	0.4432
O9	-1.0618	H21	0.4741	H33	0.4809
O10	-1.0918	H22	0.3497	H34	0.4776
O11	-0.9300	H23	0.4407		
O12	-1.0862	H24	0.3871		

状的[Al₆(OH)₂₂(H₂O)₂]⁴⁻产物, 首先应是自由基与端基上—OH₂中H结合, 并迅速释放出水分子^[17-18]。同时又与另一相同特性的基团发生聚合, 形成[Al₆(OH)₂₂(H₂O)₂]⁴⁻产物。通过对反应势能面(PES)的研究, 分别采用反应活性部位中O—O原子的距离以及O—Al原子的距离为变量, 通过BLYP/DNP优化构型为基础, 进行反应物、中间体以及过渡态的结构关联研究, 图3所示为反应路径上的中间体与过渡态的几何构型, 其相应的能量如表4所列。

图3 反应各据点的几何构型示意图

Fig. 3 Schematic diagrams of optimized geometries of various species: (a) Al₃-B cluster; (b) IM1; (c) TS1; (d) IM2; (e) TS2; (f) [Al₆(OH)₂₂(H₂O)₂]⁴⁻

表4 各种物质的零点振动能和单点能

Table 4 Zero-point vibration energy and total energy of species under DFT/BLPY/DNP level

Specie	E _T /a.u.	E _{ZPVE} /a.u.
Al ₃ -B cluster	-1791.3829	0.0088
Intermediate (IM1)	-1866.6143	0.0113
Transition (TS1)	-3580.5597	0.0108
Intermediate (IM2)	-3431.0430	0.0120
Transition (TS2)	-3431.1123	0.0151
[Al ₆ (OH) ₂₂ (H ₂ O) ₂] ⁴⁻	-3301.1497	0.0091

2.4 反应通道的设计

通过对Al₃-B基团活性部位和—OH基团的振动频率分析可知, 铝酸根聚合离子端基上的—OH基团易参与质子化或去质子化反应。过饱和中等浓度铝酸钠溶液自发成核时, 铝酸根离子之间经过配位体上的质子转移而发生相互聚合, 即羟自由基可与Al₃-B基团端基上OH₂配位体的H结合发生系列反应, 如图4所示。图4中反应(2)为Al₃-B基团端基上的OH₂中一个H与带有单电子的羟自由基结合。从反应势能面的能量信息得知: 生成物处于能量的最低点, 但对其进行力分析时, 总存在多个负值, 可以推断该物质为不稳定的中间产物。当端基上OH₂连接一个带单电子的羟自由基时, 该自由基夺去一个氢形成水分子, 从而使该端基上OH₂失去一个氢原子和一对孤电子对, 因此, 该基团迅速进行下一步反应。反应(3)表示有空轨道的—OH基团与另一个Al₃-B基团端基上的OH结合成键, 使两个铝酸根离子在终端形成桥连。含有[—HO-----OH—]的生成物在反应势能面上处于另一个能量低点, 但通过BLYP/DNP水平下的振动频率分析得知, 该物质为反应过渡态。反应(4)是两个[—HO-----OH—]与相连的Al原子发生结构重组, 从第一过渡态中脱去H₂O₂, 使铝酸根离子形成稳定的桥连。同时, 通过类似的分析可以确认第二中间物质。同样地, 当聚合体铝酸根离子另一端基上的OH₂经自由基激活后, 会发生相同的反应, 从而形成了首尾相连的六元环基团。该六元环聚合离子容易与水合钠离子发生质子交换作用, 生成有利生长基元, 最后叠合成晶体而析出。

同理, 根据羟自由基在端基上的OH₂中夺取氢原子的特性, 对反应路径作PES计算。发现当同时在一个氧上脱氢时, 反应的活化能高达210 kJ/mol, 反应直接从过渡态转变为产物。理论上, 该反应路径很难

图 4 Al_3 -B 基团环合反应机理示意图Fig. 4 Schematic diagrams showing possible reaction mechanism of Al_3 -B clusters polymerizing

发生(如图 5 路径(4))。当羟自由基同时夺取不同端基上 OH_2 的氢原子时,反应将遵从反应物 $\rightarrow$ IM2 $\rightarrow$ TS2 $\rightarrow$ 产物,其反应活化能为 109 kJ/mol(见图 5 路径(3))。

为了对比羟自由基对 Al_3 -B 基团环合反应的影响,在 DFT/BLYP/DNP 水平下,计算了无自由基参与的 Al_3 -B 基团环合反应活化能。通过对反应过渡态的确认与单点能的精确计算,采用零点振动能校正后,计算反应的活化能约为 178 kJ/mol,这与李洁^[4]的计算结果(156 kJ/mol)相差不多。

2.5 反应势能面及机理

通过对反应通道的分析与计算,根据各物质的能量,作出在羟自由基存在下 Al_3 -B 基团环合成六元环状离子,再形成有利生长基元的势能剖面图(见图 5)。图中路径(1)表示没有羟自由基参与反应,其活化能为 178 kJ/mol;路径(2)表示由于羟自由基参与环合反应而改变了反应路径,反应活化能降低至 109 kJ/mol,降低了约 70 kJ/mol。反应路径(3)与(2)类似,只是当两个自由基同时进攻时, Al_3 -B 基团直接转化为 IM2

态。路径(4)的活化能高达 210 kJ/mol,该反应路径不可能进行。因此,该羟自由基参与 Al_3 -B 基团环合反应有两条可能的反应路径(路径(2)和(3)),且其活化能相同,为 109 kJ/mol。

图 5 Al_3 -B 基团环合反应的势能面

Fig. 5 Schematic potential energy surface of reactions (R is reactant; P is product)

3 结论

1) Al_3 -B 基团端基上 OH_2 的 H 易与羟自由基($\cdot OH$) 结合, 使该部位成为羟自由基进攻的活性中心。

2) 羟自由基参与 Al_3 -B 基团环合反应有两条可能的反应路径, 其活化能为 109 kJ/mol, 比无自由基参与时降低约 70 kJ/mol。

REFERENCES

- [1] LI Xiao-bin, WANG Dan-qin, ZHOU Qiu-sheng, LIU Gui-hua, PENG Zhi-hong. Concentration variation of aluminate ions during the seeded precipitation process of gibbsite from sodium aluminate solution[J]. *Hydrometallurgy*, 2011, 106(1/2): 93-98.
- [2] ZHANG Ying, ZHENG Shi-li, DU Hao, XU Hong-bin, WANG Shao-na, ZHANG Yi. Improved precipitation of gibbsite from sodium aluminate solution by adding methanol[J]. *Hydrometallurgy*, 2009, 98(1/2): 38-44.
- [3] 李小斌, 赵东峰, 王丹琴, 阎 丽. 铝酸钠溶液分解过程的理论及技术研究进展[J]. *中国有色金属学报*, 2011, 21(10): 2577-2593.
LI Xiao-bin, ZHAO Dong-feng, WANG Dan-qin, YAN Li. Research progress in theory and technology of gibbsite precipitation from sodium aluminate solution[J]. *The Chinese Journal of Nonferrous Metals*, 2011, 21(10): 2577-2593.
- [4] 李 洁. 过饱和铝酸钠溶液结构及分解机理的研究 [D]. 长沙: 中南大学, 2002: 86-110.
LI Jie. Study on the structural characteristics and decomposition mechanism of supersaturated sodium aluminate solution[D]. Changsha: Central South University, 2002: 86-110.
- [5] 吴争平, 尹周澜, 陈启元, 李 洁. 氢氧化铝有利生长单元 $[Al_6(OH)_{18}(H_2O)_6]_n$ 微观叠合的 DFT 计算[J]. *中南大学学报(自然科学版)*, 2009, 40(3): 592-600.
WU Zheng-ping, YIN Zhou-lan, CHEN Qi-yuan, LI Jie. DFT calculation on microcosmic combination of favorable growth unit of gibbsite $[Al_6(OH)_{18}(H_2O)_6]_n$ [J]. *Journal of Central South University (Science and Technology)*, 2009, 40(3): 592-600.
- [6] ZHANG Bin, LI Jie, CHEN Qi-yuan, CHEN Guo-hui. Precipitation of $Al(OH)_3$ crystals from supersaturated sodium aluminate solution irradiated with ultrasonic sound[J]. *Minerals Engineering*, 2009, 22(9/10): 853-858.
- [7] WU Yu-sheng, QU Yan-ping, ZHANG Lin-nan, LIU Mo. Effect of α_k on aluminium trihydroxide crystallization from sodium aluminate solution under ultrasound[C]//Physical and Numerical Simulation of Material Processing VI, PTS 1 AND 2. Materials Science Forum. Switzerland: Transaction Technical Publications Limited, 2012: 364-369.
- [8] 孙文乐, 张 扬, 马淑花, 王月娇, 丁 健, 唐振华, 郑诗礼. 超声波强化铝酸钠结晶工艺[J]. *过程工程学报*, 2013, 13(6): 992-997.
SUN Wen-le, ZHANG Yang, MA Shu-hua, WANG Yue-jiao, DING Jian, TANG Zhen-hua, ZHEN Shi-li. Crystallization process of sodium aluminate enhanced by ultrasonic wave[J]. *The Chinese Journal of Process Engineering*, 2013, 13(6): 992-997.
- [9] 刘吉波, 张牧群, 尹周澜, 张平民, 陈启元. 铝酸钠溶液性质对超声空化作用及种分过程超声强化的影响[J]. *中国有色金属学报*, 2004, 14(6): 1047-1052.
LIU Ji-bo, ZHANG Mu-qun, YIN Zhou-lan, ZHANG Ping-min, CHEN Qi-yuan. Effect of physical properties of sodium aluminate solution on ultrasonic cavitation and enhancement during precipitation process[J]. *The Chinese Journal of Nonferrous Metals*, 2004, 14(6): 1047-1052.
- [10] HU Yu-fei, ZHANG Zhu-jun, YANG Chun-yan. Measurement of hydroxyl radical production in ultrasonic aqueous solutions by a novel chemiluminescence method[J]. *Ultrasonics Sonochemistry*, 2008, 15(5): 665-672.
- [11] 张牧群, 尹周澜, 陈启元. 铝酸钠溶液中超声诱致自由基的检测[J]. *中国稀土学报*, 2004, 22(z1): 207-211.
ZHANG Mu-qun, YIN Zhou-lan, CHEN Qi-yuan. Inspection of the free radicals in sodium aluminate solution caused by ultrasound[J]. *Journal of The Chinese Rare Earth Society*, 2004, 22(z1): 207-211.
- [12] 尹周澜, 花书贵, 张牧群, 李 洁, 陈启元. 超声场强化铝酸钠溶液种分过程的理论研究[J]. *中国稀土学报*, 2004, 22(z1): 188-191.
YIN Zhou-lan, HUA Shu-gui, ZHANG Mu-qun, LI Jie, CHEN Qi-yuan. Theoretical research on the precipitation of sodium aluminate solutions enhanced by ultrasound[J]. *Journal of The Chinese Rare Earth Society*, 2004, 22(z1): 188-191.
- [13] 朱龙观. 高等配位化学[M]. 上海: 华东理工大学出版社, 2009: 280-310.
ZHU Long-guan. Advanced coordination chemistry[M]. Shanghai: East China University of Science and Technology Press, 2009: 280-310.
- [14] KUBICKI J, APITZ S. Molecular cluster models of aluminum oxide and aluminum hydroxide surfaces[J]. *American Mineralogist*, 1998, 83: 1054-1066.
- [15] STEMMLER K, von GUNTEN U. OH radical-initiated oxidation of organic compounds in atmospheric water phases: part 2. Reactions of peroxy radicals with transition metals[J]. *Atmospheric Environment*, 2000, 34(25): 4253-4264.
- [16] CABRAL C, GUEDES R C, COSTA CABRAL B J, MARTINHO SIMÕES J A. The hydration of the OH radical: Microsolvation modeling and statistical mechanics simulation[J]. *The Journal of Chemical Physics*, 2003, 119(14): 7344-7355.
- [17] GOVIND N, PETERSEN M, FITZGERALD G, KING-SMITH D, ANDZELM J. A generalized synchronous transit method for transition state location[J]. *Computational Materials Science*, 2003, 28(2): 250-258.
- [18] PARADAS M, CAMPAÑA A G, JIMÉNEZ T, ROBLES R, OLTRA J E, BUÑUEL E, JUSTICIA J, CÁRDENAS D J, CUERVA J M. Understanding the exceptional hydrogen-atom donor characteristics of water in Ti(III)-mediated free-radical chemistry[J]. *Journal of the American Chemical Society*, 2010, 132(36): 12748-12756.

(编辑 龙怀中)